

### **Mise à jour sur l'invasion des criquets en Afrique de l'Est**

Dans la Corne de l'Afrique, les opérations de contrôle aérien se poursuivent contre plusieurs essaims immatures qui sévissent dans le nord-ouest du Kenya. Certains des essaims adultes commencent à arriver à maturité, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une génération de reproduction lorsque les courtes pluies commenceront en octobre. Le 22 août, au moins un essaim a traversé le nord-est de l'Ouganda et se serait propagé dans les districts de Moroto, Amudati et Napak, tandis qu'un autre essaim est arrivé dans le sud-est du Soudan, au sud de Kapoeta, dans l'Equatoria oriental. Les essaims sont mobiles et ne devraient pas arriver à maturité ou se reproduire dans l'un ou l'autre pays. Dans le nord-est de l'Éthiopie, des essaims matures provenant de l'Afar se sont concentrés le long d'un tronçon de 400 km de l'escarpement sur les bords orientaux des hauts plateaux de l'Amhara et du Tigray où la ponte provoquera la formation de bandes larvaires. Jusqu'à présent, au moins une bande s'est formée au Tigray, au sud de Mekele. Des opérations de contrôle aérien et terrestre sont en cours. Des essaims immatures persistent dans les hautes terres de Harar, dans les régions orientales proches, et sur le plateau du nord-ouest de la Somalie où des opérations de contrôle aérien sont en cours à l'aide de biopesticides. Ces essaims pourraient arriver à maturité et éventuellement se reproduire dans les zones de précipitations, y compris sur la côte nord-ouest où des groupes d'adultes sont présents.